



**Linfoma de Hodckin :** É um tumor nos gânglios e baço, mais frequente em adolescentes. A maioria dos casos começa com inguvas que vão crescendo. A criança pode apresentar febre prolongada e perda de peso.

**Retinoblastoma:** É diagnosticado por intermédio de um sinal característico, o chamado "reflexo de olho de gato" que é o embranquecimento da pupila quando exposta a luz. Geralmente acontece em crianças antes dos 3 anos de idade. O diagnóstico deve ser feito por Oftomologista.

**Tumores Do Sistema Nervoso Central:** Cérebro e cerebelo são os tumores sólidos mais frequentes na infância e representam 20 % dos cânceres infanto-juvenis. Podem causar dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva ou dupla, tontura e dificuldade de caminhar ou manipular objetos.

**Tumores Ósseos:** São mais frequentes em adolescentes. Quase sempre a criança conta que teve uma batida, que causou dor, mas a dor não vai embora. Provoca dor óssea, que piora à noite ou com atividade e pode causar inchaço na área ao redor do osso. O local mais comum é logo acima ou logo abaixo do joelho. A pele pode ficar vermelha e quente e, quando o tumor cresce, é possível ver também um inchaço no local, podem ser confundidos principalmente com infecções ou dores de crescimento. O diagnóstico pode ser realizado por Ortopedista.

**Fique Atento aos Sinais!**



### Ação Infância e Vida

Para apoio à luta das crianças contra a doença, a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência às Crianças e Adolescentes com Câncer – Coniacc e o Banco do Brasil lançaram a *Ação Infância e Vida*, que tem como objetivo mobilizar funcionários e clientes para apoiar instituições de apoio à criança e adolescente com câncer.

A campanha é estruturada em três eixos de atuação:

- a doação de recursos financeiros;
- a mobilização do voluntariado; e
- a educação para identificação de sinais de sintomas do câncer infantojuvenil e outras iniciativas voltadas ao diagnóstico precoce da doença.

A principal iniciativa da Ação é a arrecadação de recursos financeiros (em reais, dotz e pontos pra você; Ponto pra sua Empresa do Banco do Brasil), que serão integralmente direcionados às instituições vinculadas à CONIACC, que reúne casas de apoio ao tratamento de câncer, na maior parte dos estados do Brasil.

**Saiba mais acessando o hotsite: [bb.com.br/infanciaevida](http://bb.com.br/infanciaevida)**

Doe e ajude as Casas de Apoio à Criança com Câncer:

**Coniacc**

Ag. 2870-3 C/C: 33.000-0



# Ação Infância e Vida



**Diagnóstico Precoce Câncer Infantojuvenil**

*Setembro Dourado*



## Principais Sintomas

Existem diversos sinais pelos quais se pode supor que uma criança ou adolescente sofre algum tipo de câncer, fique atento:



- Dores de cabeça pela manhã com vômito;
- Caroços no pescoço, axilas e na virilha;
- Ínguas que não resolvem;
- Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças;
- Manchas arroxeadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas;
- Aumento do tamanho da barriga;
- Brilho branco nos olhos quando a criança sai em fotografia com flash.

## Tipos de Câncer mais Comuns



**Linfoma Não-Hodckin:** Conhecido como câncer do sistema linfático, pode estar presente em qualquer parte do corpo, principalmente tórax e abdome. Quando na barriga pode causar parada de evacuações e dor de barriga. Quando o linfoma é no tórax, pode causar tosse ou falta de ar.

**Tumor de Wilms:** Inicia em um, ou raramente, ambos os rins, manifestando-se como uma massa no abdômen, geralmente palpado pelas mãos na hora do banho. Mais frequentemente encontrado em crianças de 3 e 4 anos de idade. Pode-se se mostrar como um inchaço ou caroço na barriga. A criança pode ainda apresentar sangue na urina, dores abdominais e pressão alta.



De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que em torno de 70% das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados.

**PERSISTINDO OS SINTOMAS PROCURE UM MÉDICO!!**

**Sarcomas de Partes Moles:** São tumores que podem ocorrer em músculos, gorduras e articulações. Afetam tanto crianças, quanto adolescentes e adultos. Existe um aumento progressivo, inchaço no local do tumor e, em geral, há dores e a pele pode ficar vermelha.

Os sarcomas podem ocorrer na cabeça, no pescoço, na área genital, nos braços e nas pernas. Em adolescentes, pode localizar-se na região dos testículos, provocando o aumento do escroto, sendo confundido com hérnias.

**Leucemia:** É o câncer mais comum na infância, variando de 25 a 35 % dos casos. É caracterizado pela produção excessiva de células brancas anormais, superpovoando a medula óssea impedindo que as células normais sejam produzidas provocando infecções, palidez, sangramentos, dor nos ossos e articulações, fadiga, fraqueza, febre e perda de peso.



***“Em toda a Criança com Câncer existe um adulto com grande chance de viver!”***