

Ação Infância e Vida

Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil

Principais Sintomas

Existem diversos sinais pelos quais se pode supor que uma criança ou adolescente sofre algum tipo de câncer, fique atento:

- Dores de cabeça pela manhã com vômito;
- Caroços no pescoço, axilas e na virilha;
- Ínguas que não resolvem;
- Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças;
- Manchas arroxeadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas;
- Aumento do tamanho da barriga;
- Brilho branco nos olhos quando a criança sai em fotografia com flash.



Tipos De Câncer Mais Comuns

Linfoma de Hodgkin: É um tumor nos gânglios e baço, mais frequente em adolescentes. A maioria dos casos começa com ínguas que vão crescendo. A criança pode apresentar febre prolongada e perda de peso.

Retinoblastoma: É diagnosticado por intermédio de um sinal característico, o chamado "reflexo de olho de gato" que é o embranquecimento da pupila quando exposta a luz. Geralmente acontece em crianças antes dos 3 anos de idade. O diagnóstico deve ser feito por Oftalmologista.

Tumores Do Sistema Nervoso Central: Cérebro e cerebelo são os tumores sólidos mais frequentes na infância e representam 20 % dos cânceres infanto-juvenis. Podem causar dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva ou dupla, tontura e dificuldade de caminhar ou manipular objetos.

Sarcomas de Partes Moles: São tumores que podem ocorrer em músculos, gorduras e articulações. Afetam tanto crianças, quanto adolescentes e adultos. Existe um aumento progressivo, inchaço no local do tumor e, em geral, há dores e a pele pode ficar vermelha. Os sarcomas podem ocorrer na cabeça, no pescoço, na área genital, nos braços e nas pernas. Em adolescentes, pode localizar-se na região dos testículos, provocando o aumento do escroto, sendo confundido com hérnias.

Tipos De Câncer Mais Comuns

Linfoma Não-Hodckin: Conhecido como câncer do sistema linfático, pode estar presente em qualquer parte do corpo, principalmente tórax e abdome. Quando na barriga pode causar parada de evacuações e dor de barriga. Quando o linfoma é no tórax, pode causar tosse ou falta de ar.

Tumor de Wilms: Inicia em um, ou raramente, ambos os rins, manifestando-se como uma massa no abdômen, geralmente palpado pelas mãos na hora do banho. Mais frequentemente encontrado em crianças de 3 e 4 anos de idade. Pode-se se mostrar como um inchaço ou caroço na barriga. A criança pode ainda apresentar sangue na urina, dores abdominais e pressão alta.

Leucemia: É o câncer mais comum na infância, variando de 25 a 35 % dos casos. É caracterizado pela produção excessiva de células brancas anormais, superpovoando a medula óssea impedindo que as células normais sejam produzidas provocando infecções, palidez, sangramentos, dor nos ossos e articulações, fadiga, fraqueza, febre e perda de peso.

Tumores Ósseos: São mais frequentes em adolescentes. Quase sempre a criança conta que teve uma batida, que causou dor, mas a dor não vai embora. Provoca dor óssea, que piora à noite ou com atividade e pode causar inchaço na área ao redor do osso. O local mais comum é logo acima ou logo abaixo do joelho. A pele pode ficar vermelha e quente e, quando o tumor cresce, é possível ver também um inchaço no local, podem ser confundidos principalmente com infecções ou dores de crescimento. O diagnóstico pode ser realizado por Ortopedista.

Acesse: bb.com.br/infanciaevida